

Procambarus clarkii (Girard, 1852)



Lugar de proveniencia

Nativa do Noreste de México e centro-sur de Estados Unidos.

Hábitat en área de introducción

Ambientes lóticos, sustratos blandos de ríos, marismas e charcas; tolera un amplio rango de condicións ambientais incluíndo augas salinas ou períodos de desecación.

Normativa Nacional: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras



Cangrejo rojo, Cangrejo americano, Cangrejo de las marismas



Cangrexo de río americano



Cranc vermell dels pantans, Cranc americá



Karramarro amerikarra

Biología

Especie de crecemento rápido, omnívora de amplio espectro trófico, incluíndo na súa dieta caracois, plantas acuáticas, anfibios e peixes, materia vexetal morta e cadáveres de animais. Máis resistente que o cangrexo autóctono, soportando niveis baixos de oxíxeno, temperaturas altas e un alto grado de contaminación. Hábitos menos crepusculares polo que é doadoo velo a plena luz do día. Trala fecundación a femia permanecerá nos túneles ata a posta en primavera e dos ovos surxen pequenos cangrexos que non pasan por estados larvarios intermedios.

Campus de Vigo

Diversos redutos nas lagoas de Ciencias e de Servizos de Deporte.

Introducción

Introducida con fins comerciais no ano 1974 nas Marismas do Guadalquivir e posterior solta polos ríos para o seu comercio, consumo local e para ser utilizado como cebo.