



Taxón	Hábitat	Descrición
<p data-bbox="315 144 488 175"><i>Frullania</i> sp</p> 	<p data-bbox="696 329 1137 360">Presente en <i>Prunus</i> sp no campus.</p>	<p data-bbox="1245 285 2022 440">Hepática foliosa, forma céspedes aplanados sobre o sustrato, de cor verde a marrón púrpura, caulídios moi ramificados e filídios con dous lóbulos, un grande dorsal e un pequeno dental con forma de casco.</p>
<p data-bbox="199 564 607 595"><i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.</p> 	<p data-bbox="689 736 1144 767">Presente en <i>Morus alba</i> no campus.</p>	<p data-bbox="1267 698 2007 852">Musgo pleurocárpico (postrado), de cor amarela-verdoso, filídios falciformes e acuminados. Cápsula recta ou lixeiramente curvada. Moi común nas codías das árbores e nas rochas.</p>
<p data-bbox="221 986 584 1017"><i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Bridel</p> 	<p data-bbox="689 1136 1144 1166">Presente en <i>Morus alba</i> no campus.</p>	<p data-bbox="1238 1102 2033 1282">Musgo acrocárpico (erecto), de cor verde, filídios fortemente retorcidos en estado seco (de aquí deriva o epíteto específico). Filídios lanceolados coa marxe recurvada. Cápsula do esporofito erecta, con surcos lonxitudiais e cunha cofía moi pilosa.</p>

*Texto adaptado, procedente de: Fernández Ordoñez, M. & Collado Prieto, M.A. (2003). Briófitos de la Reserva Natural Integral de Muniellos, Asturias. Oviedo, KRK Ediciones. Ilustracións: Antía Ares Carril.*