Salix atrocinerea Brot., 1804

- salgueiro negro, zao
- sauce ceniciento, sauce cenizo, sarga negra
- sahats iluna, sahats gris
- salze cendrós
- grey willow
- salgueiro preto



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX | ES | CR | EP | VU | CA | PM

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Malpighiales**	**Salicaceae**	***Salix***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Porte arbóreo pequeno. Crecemento rápido. Pode chegar ata os 12 m de altura. Lonxevidade media. Copa densa e irregular, con pólas tortas e flexibles. Codia agrisada ou parda escura, agretada cos anos. Follas alternas, lixeiramente serradas, de forma ovalada ou elíptica lixeiramente apuntadas, de cor verde escuro na face e agrisadas no envés, con peliños finos. Flores en amentos (inflorescencias colgantes), aparecen antes ou ao mesmo tempo cás follas. Florece en inverno-primavera. Os froitos teñen forma de cápsula pequena, liberan sementes, presentan pelos brancos, frutificación en primavera-verán.

HÁBITAT

Típica de bosques de ribeira. Habita en zonas húmidas, beiras de ríos, brañas e terreos enchoupados. Preferentemente en solos frescos e siliciclásticos, ácidos.

DISTRIBUCIÓN

Zonas do sueste de Europa, principalmente na Península Ibérica e Francia.

CURIOSIDADES

Ten unha gran capacidade de rebrote e tamén como estabilizadora de solos húmidos.