Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

- queiroga da cruz, uz montesa, urce m., quiroga da cruz
- brecina, brecinilla, berozo, biércol merino, bruguerola, bruza, garbeña
- txilar arrunt o elharr
- bruguerola
- heath, heather, (common) ling
- urze o queiró



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Ericales**	**Ericaceae**	***Calluna***

ORIXE

Europa, norte de África e América do Norte.

CARACTERÍSTICAS

Arbusto perenne de pequeno tamaño que pode medrar de forma rastreira ou erecta. Normalmente non supera o metro de altura. As follas son moi pequenas (1-3 mm), imbricadas, dispostas en catro filas e de cor verde. As flores dispóñense en acios terminais, con catro lóbulos. Poden ser de varias cores (brancas, rosas, lilas, vermellas) aínda que o máis común é o púrpura. O froito é unha cápsula que contén numerosas sementes moi pequenas.

HÁBITAT

Solos ácidos e ben drenados, como breixeiras, landas e claros de bosques, e atópase dende o nivel do mar ata altitudes montañosas.

DISTRIBUCIÓN

Ampla distribución natural en Europa, norte de África e o norte de América, e foi introducida noutras partes do mundo.

CURIOSIDADES

Ten propiedades medicinais, úsase en cerámica e tamén se obten mel a partir dela.