
Erica tetralix L., 1753

- carroucha das brañas, quieriño setembrino, bugallón
- brezo de turbera, brezo en cruz, carroncha
- ainarra lahuostoa
- bruc d'aiguamoll
- cross-leaved heath
- margariça



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Ericales**	**Ericaceae**	***Erica***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Arbusto pequeno de ata 45 cm de altura. Os seus talos teñen costelas pouco visibles, codia avermellada, ás veces con pelos longos, glandulares e espallados. As follas aparecen en verticilos de 4, son erecto-escampadas ou espalladas e teñen forma lineal ou oblongo-lanceolada, cunha banda esbrancuxada no envés. Teñen pelos glandulares e non glandulares ao longo da marxe. As flores están dispostas nunha inflorescencia terminal, unilateral, en forma de umbela, con ata 15 flores e pedicelos pilosos. O froito é unha cápsula globosa e pilosa que contén sementes elipsoidais e ovoides.

HÁBITAT

Medra en breixeiras húmidas, turbeiras, marismas e beiras de regatos. Dende o nivel do mar ata 2100 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Oeste e norte de Europa. Na Península Ibérica atópase no norte, centro e cuadrante noroeste.

CURIOSIDADES

Cultívase como ornamental e melífera.