Erica umbellata L., 1753

- carroucha de umbela, carrasco de umbela
- brezo de umbelas, mogariza, quiruela, brezo aparasolado
-
- bruguerola, bruc d'hivern
- dwarf spanish heath
- queiró



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Ericales**	**Ericaceae**	***Erica***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Planta arbustiva de ata 50 cm de altura. Talos novos con costelas apenas marcadas, codia marrón avermellada e un indumento de pelos curtos, que poden ser glandulares. As follas están dispostas en verticilos de 3, erectas ou erecto-escampadas, de forma lineal ou linear-lanceolada. A superficie superior é pilosa cando son novas e ciliada. As flores están dispostas en inflorescencias terminais semellantes a unha umbela, con 3 a 6 flores cada unha e carecen de involucro basal. Os seus pedicelos, de ata 5 mm de longo, marrón-amarelado ou avermellado, son pubescentes e teñen 3-4 bractéolas de ata 1,5 mm de longo. O froito é unha cápsula de 2–2,5 mm de longo, piramidal ou subglobosa e glabra.

HÁBITAT

Medra en breixeiras despexadas ou ananas, matogueiras, bosques abertos e zonas areosas preto da costa. En solos ácidos dende o nivel do mar ata os 1500 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Península Ibérica e noroeste de África.

CURIOSIDADES

Planta melífera e ornamental que florece de febreiro a xullo.