Teucrium scorodonia (L.) L., 1753

- seixebra, ourego bravo, teúdo, amenta de cobra, escordonia
- escorodonia, escordio bastardo, salvia bastarda
- eskoria-belar, lurri-belar
- escorodònia, escori
- wood sage
- escorodónia



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX | ES | CR | EP | VU | CA | **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Lamiales**	**Lamiaceae**	***Teucrium***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Arbusto perenne de 25-100 cm de altura, rizomatoso, con talos ascendentes, avermellados. Pelos longos retroflexos, estendidos ou flexuosos e outros curtos e retrorsos, que se volven glabrescentes coa idade. Follas 40×35-40 mm, en verticilos separados, con internodos duns 5-6 cm, cun pecíolo de 1-2 cm, biserradas ou serradas. Inflorescencia nun tirso pechado de 3-8 ramas, formadas por acios laxos de dúas flores. Flores con pedicelos de 2-4 cm, retrorsos na frutificación, con pelos retroflexos.

HÁBITAT

Sotobosque de faias, sobreiras, caxigos, freixos, piñeiros ou bosques mixtos, uceiras, pastos de montaña, lugares húmidos e sombríos, beiras de estradas e marxes de ríos. Tamén en lugares abertos e solleiros sobre substrato silíceo, areoso ou calcario.

DISTRIBUCIÓN

Europa. Amplamente distribuída por toda a Península Ibérica, excepto en Levante e no sueste.

CURIOSIDADES

Nas poboacións ibéricas ás veces diferéncianse glándulas esferoidais no cáliz.