Ulex gallii Planch., 1849

- toxo molar/femia/gateño/mouro, molaria
- tojo menor, estojo menor, árgoma
- ote beltza
- toixa, argome
- dwarf gorse/furze
- tojo molar



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Fabales**	**Fabaceae**	***Ulex***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Porte arbustivo, compacto e denso, ronda o metro de altura. Perenne. Múltiples talos ramificados, espiñosos, con crecemento arqueado ou erecto. Nas plántulas as follas presentan folíolos, son trifoliadas, pero nos exemplares adultos redúcense a escamas espiñosas. Flores de cor amarela brillante, moi perfumadas. A floración comeza en primavera. O froito é seco e endurecido, e ábrese explosivamente ao madurar, liberando así as sementes, as cales son moi duradeiras. A polinización ocorre principalmente por vía insectívora. Presentan un sistema radicular profundo que lles confire esa capacidade de supervivencia en ambientes pobres.

HÁBITAT

Crece en solos pobres, ácidos, uceiras, zonas costeiras expostas ou montañas de orientación atlántica. Comunmente solos degradados ou pouco fértiles.

DISTRIBUCIÓN

Orixinaria da franxa atlántica europea: sur de Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda, costa occidental de Francia e norte da Península Ibérica.

CURIOSIDADES

Como moitas especies deste xénero, ten unha gran capacidade para adaptarse á acción do lume e rebrotar tras os incendios.