

Columba palumbus Linnaeus, 1758

	poombo, torcaza, turcacia, pombo torcaz
	torcaz, paloma torcaz
	pagauso
	tudó
	common wood pigeon, culver
	pombo-torcaz



ESTADO DE CONSERVACIÓN



MEDIDAS CORPORAIS

Peso	300-615 g
Lonxitude	38-44,5 cm
Envergadura	68-80 cm

FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba</i>

ALIMENTACIÓN

Follas, herbáceas, brotes, sementes, landras, figos, larvas, crisálidas e insectos brandos.

COMPORTEMENTO

Son animais diúrnos, monógamos e sociais, que adoitan vivir en grandes bandadas agás pola época de reprodución, que están en parellas. Nunha boa parte da súa distribución son sedentarios, pero nas máis frías migran no inverno a rexións cálidas.

REPRODUCCIÓN

A época de celo abrangue dende marzo ata setembro. Poñen 1-2 postas de 1-2 ovos ao ano, que ambos pais incuban durante 17-19 días. A cría voa ás 33-34 días e acada a madurez sexual pouco despois.

HÁBITAT

Sobre todo bosques frondosos, pero tamén matos, devesas e cultivos.

DISTRIBUCIÓN

Meirande parte de Europa, incluíndo Islandia, e tamén no oeste do Magreb, Macaronesia, norte de Oriente Próximo, Asia Central, extremos setentrionais de Asia do Sur e algunhas rexións do sur da Rusia asiática de do norte de Mongolia.

CURIOSIDADES

Tanto machos como femias producen no seu bucho o leite de pomba, unha secreción que serve como alimento para as súas crías.

A subespecie presente no campus é *Columba palumbus palumbus* Linnaeus, 1758, propia de Europa, norte de África e oeste de Asia.