

# Galerida cristata (Linnaeus, 1758)

	cotovia cristada, cotovia dos camiños
	cogujada común
	kutturlio arrunta
	cogullada vulgar
	crested lark
	cotovia-de-poupa



FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Alaudidae	<i>Galerida</i>



## ESTADO DE CONSERVACIÓN



## MEDIDAS CORPORAIS

<b>Peso</b>	37-55 g
<b>Lonxitude</b>	17-19 cm
<b>Envergadura</b>	29-38 cm

## ALIMENTACIÓN

Sementes, follas, froitos e escaravellos.

## COMPORTEMENTO

Son animais diúrnos, territoriais e solitarios. Cambian de parella cada 1-3 anos. Ademais de cantar, machos e femias emiten fortes sons peteirando na madeira tanto como reclamo como para marcar o seu territorio.

## REPRODUCCIÓN

A época de celo abrangue dende marzo ata xullo. Poñen 1-3 postas de 3-7 ovos, que son incubados pola femia durante 11-13 días. As crías poden voar aos 15-16 días. Acadan a madurez ao ano.

## HÁBITAT

Devesas, campos abertos, zonas urbanas e cultivos de cereais.

## DISTRIBUCIÓN

Europa continental agás polo sur de Europa Central, Escandinavia e as repúblicas bálticas; Sicilia, illas gregas, Chipre, Oriente Próximo agás por Anatolia, Asia Central, Paquistán, Afganistán, noroeste da India, Mongolia, norte de China, Corea e metade norte de África.

## CURIOSIDADES

Ao inicio da época reprodutora, as parellas, sobre todo os machos, pasan 2-3 semanas perforando a cortiza dunha árbore co seu peteiro para construír o seu niño.

A subespecie presente no campus é *Galerida cristata* subsp. *pallida* Brehm, 1858, propia da península Ibérica.