

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)

	andoriña
	golondrina común
	enara arrunta
	oreneta vulgar
	barn swallow
	andorinha-das-chaminés



ESTADO DE CONSERVACIÓN



MEDIDAS CORPORAIAS

Peso 19 g

Longitude 18 cm

Envergadura 33 cm

FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Hirundo</i>

ALIMENTACIÓN

Insectívora: moscas, mosquitos, formigas, avésporas, chinches, pequenos escaravellos, etc.

COMPORTAMENTO

O voo desta ave é moi acrobático e veloz, con xiros e cambios continuos de altura, moi preto do chan. Cría habitualmente en cortes e construcións similares, construíndo os niñeiros en vigas e saíntes.

REPRODUCCIÓN

Celo variable: de marzo a agosto. 2-3 postas, de 4-5 ovos de cor crema e pintas vermelizadas e incubados polas femias 15 días. Os polos voan aos 20-25 días.

HÁBITAT

Nidifica en construcións camprestres e urbanas. Preto de auga, en prados e cultivos.

DISTRIBUCIÓN

En inverno, Sudamérica, África, sur de Asia e norte de Australia. O resto do ano ocupa grande parte de Norteamérica e Eurasia (salvo zonas árticas e desertos).

CURIOSIDADES

Existe un reparto da columna de aire entre as andorriñas, os avións e os vencellos, sendo as primeiras as que máis preto do chan voan. Non obstante, rara vez se ven pousadas no chan, soamente o fan para recoller materiais para a construción do seu niñeiro.

Captura no aire aos insectos dos que se alimenta, habitualmente.

No noso territorio aparece a forma nominal.