







Cecropis daurica (Laxmann, 1769)

 andoriña dáurica
 golondrina dáurica
 enara ipurgorra
 oreneta cua-rogenca
 red-rumped swallow
 andorinha-dáurica



ESTADO DE CONSERVACIÓN



MEDIDAS CORPORAIS

Peso	23 g
Lonxitude	17 cm
Envergadura	33 cm

FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Hirundinidae	Cecropsis

ALIMENTACIÓN

Moscas, mosquitos, formigas, avespas, chinches e pequenos escaravellos.

COMPORTEMENTO

Esta especie constrúe o seu característico niño con bolas de barro. Este está completamente pechado excepto por unha entrada en forma de tubo, e adóitano facer pegado ao teito de covas ou infraestruturas coma túneles ou pontes.

REPRODUCCIÓN

Celo de abril a setembro. 2-3 postas, de 3-5 ovos de cor crema e con pintas vermellas que son incubados por ambos sexos durante uns 15 días. Despois de 27 días os polos abandonan o niño.

HÁBITAT

Bosques, devesas, mato, pasos; aldeas e pequenas cidades en menor medida.

DISTRIBUCIÓN

Nidifica en grande parte de Asia e pequenas áreas de África e o sur de Europa. Trátase dunha especie migratoria.

CURIOSIDADES

A familia mantense unida durante un tempo despois de que os novos sexan xa capaces de valerse por si mesmos, durmindo todos no mesmo niño. Son aves con moita fidelidade ao sitio de cría, reutilizando o niño durante varios anos coas debidas reparacións de desperfectos invernaís; non obstante, non sempre son os mesmos adultos quen os usan xa que os xuvenís adoitan volver á zona onde naceron ..

A subespecie presente en España é *Cecropis daurica subsp. rufula*.