

Sylvia communis Latham, 1787

	papuxa común
	curruca zarcera
	sasi-txinboa
	tallareta vulgar
	common whitethroat
	papa-amoras-comum



FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia</i>



ESTADO DE CONSERVACIÓN



MEDIDAS CORPORAIS

Peso	15 g
Lonxitude	14 cm
Envergadura	18-23 cm

ALIMENTACIÓN

Principalmente invertebrados, ademáis de pequenos froitos (bagas) en verán-outono.

COMPORTEMENTO

O macho constrúe varios niños en forma de copa escondidos preto do chan entre a vexetación usando herbas trenzadas e forrados de pelo ou plumas, dos cales a femia escollerá un.

REPRODUCCIÓN

Celo de maio a xullo, con dúas postas anuais de 1-7 ovos de cor branca-verdosa, que ambos proxenitores incuban alternamente durante 11-12 días. Os polos poden voar aos 10-12 días, independizándose nos seguintes 15-20 días.

HÁBITAT

En zonas frescas e húmidas, principalmente matogueiras e zonas de mosaico forestal.

DISTRIBUCIÓN

Como reprodutora esténdese por toda Europa e Asia occidental, así como puntualmente no norte de África, Oriente Medio e Oriente Próximo. durante o inverno atópase no sur do Sáhara, dende Senegal ata Etiopía e Sudáfrica.

CURIOSIDADES

O cortexo nupcial desta especie é violento, xa que o macho persigue á femia ofrecéndolle unha herba para despois lanzarse sobre ela como atacando, ao que ela responde abrindo ás e cola e saltando sobre o macho, facendo que este retroceda.

A forma nominal é a que aparece no noso territorio.