

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

	papuxa das amoras
	curruca capirotada
	txinbo kaskabeltz
	tallarol de casquet
	blackcap
	toutinegra-de-barrete-preto



ESTADO DE CONSERVACIÓN



MEDIDAS CORPORAIAS

Peso 18 g

Longitude 13 cm

Envergadura 20-23 cm

FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Sylviidae	<i>Sylvia</i>

ALIMENTACIÓN

Invertebrados durante a época reprodutora, froitos diversos en outono/inverno.

COMPORTAMENTO

A femia constrúe un niño lixeiro en forma de copa con raíces, herbas secas e forrado con pelos, que sitúa entre a maleza.

REPRODUCCIÓN

Celo de abril a xullo. Dúas postas anuais, de 2-7 ovos brancos-rosados e moteados, que son incubados polos pais durante 11-12 días. Os polos son capaces de voar aos 8-14 días.

HÁBITAT

Ambientes forestais frescos e húmidos

DISTRIBUCIÓN

Amplamente distribuída por toda Europa, Asia central e norte de África. Aparece puntualmente no entorno do mar Negro.

CURIOSIDADES

Debido á súa predilección polas moras en outono, estas aves van manchadas na cara e cola con tinte púrpura.

A parada nupcial do macho consiste nun contínuo axitar de alas e cola con frenesi, inchando o peito.

A forma máis común no noso territorio é a "heineken".