

# Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | estrelina riscada            |
|  | reyezuelo listado            |
|  | erregetxo bekainzuria        |
|  | bruel                        |
|  | firecrest                    |
|  | estrelinha-de-cabeça-listada |



| FILO     | CLASE | ORDE          | FAMILIA   | XÉNERO         |
|----------|-------|---------------|-----------|----------------|
| Chordata | Aves  | Passeriformes | Sylviidae | <i>Regulus</i> |



## ESTADO DE CONSERVACIÓN



## MEDIDAS CORPORAIS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso</b>        | 5,5 g    |
| <b>Lonxitude</b>   | 9 cm     |
| <b>Envergadura</b> | 13-16 cm |

## ALIMENTACIÓN

Pequenos invertebrados: colémbolos, pulgóns e arañas.

## COMPORTEMENTO

É un paxaro pequeno pero cunha actividade frenética, que se move activamente entre o follato. Ámbolos dous sexos constrúen nun complexo niño suspendido entre as ramas de árbores ou arbustos con musgos, telas de araña, pelos e herbas.

## REPRODUCCIÓN

Celo de abril a xullo. As postas, 2 anuais, constan de 7 a 12 ovos de pequeno tamaño e cor branca ou crema moteados, que a femia incubo durante 14-16 días. os polos son capaces de voar aos 22-24 días e independízanse cun mes de idade

## HÁBITAT

Forestal, en formacións frescas e húmidas como os bosques de media montaña

## DISTRIBUCIÓN

Continuamente estendida por Europa central e meridional, noroeste de África e Asia Menor.

## CURIOSIDADES

Durante o cortexo o macho estende e levanta a crista alaranxada, característica desta especie. En inverno deambulan polas ramas das árbores movéndose de forma contínua e explorando tódolos buratos das cortizas en busca de alimento, reclamándose sen cesar para manter o contacto.

A subespecie que aparece no noso territorio é *R. ignicapillus* subsp. *ignicapillus*.