

# Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)

	papamoscas negro
	papamoscas cerrojillo
	euli-txori-beltza
	mastegatxes
	pie'd flycatcher
	papa-moscas-preto



## ESTADO DE CONSERVACIÓN



## MEDIDAS CORPORAIS

<b>Peso</b>	14,5 g
<b>Lonxitude</b>	12-13 cm
<b>Envergadura</b>	21,5-24 cm

FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Muscicapidae	<i>Ficedula</i>

## ALIMENTACIÓN

Insectos voadores ou insectos das follas das árbores.

## COMPORTEMENTO

A femia constrúe un niño con follas e herba nos buratos preexistentes en troncos das árbores.

## REPRODUCCIÓN

Celo dende finais de abril. Unha posta de 3-7 ovos de cor azul pálido que a femia incuba durante 12-14 días. Os polos poden voar aos 13-17 días, ata que se independizan uns días máis tarde.

## HÁBITAT

Masas boscosas maduras e densas

## DISTRIBUCIÓN

Repartida uniformemente polo norte e centro de Europa e a metade occidental de Asia. Aparece de forma fragmentada na rexión mediterránea e no sur de Asia.

## CURIOSIDADES

O seu método de captura de insectos varía: se se trata de insectos voadores, saíran na súa persecución, volvendo despois á mesma percha ou a outra cercana; se son insectos marchadores, lánzanse ao chan para collelos podendo dar algúns saltos antes de capturalos.

No noso territorio aparecen as subespecies *F. hypoleuca* subsp *iberiae* (como reprodutora) e *F. hypoleuca* subsp. *hypoleuca* (como migrante e reprodutora no norte).