

# Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

	ferreiriño rabilongo
	mito
	buztanluzea
	mallerenga cuallarga
	long-tailed tit
	chapim-rabilongo



## ESTADO DE CONSERVACIÓN



## MEDIDAS CORPORAIS

<b>Peso</b>	8 g
<b>Lonxitude</b>	12-14 cm
<b>Envergadura</b>	16-19 cm

FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
<b>Chordata</b>	<b>Aves</b>	<b>Passeriformes</b>	<b>Aegithalidae</b>	<b>Aegithalos</b>

## ALIMENTACIÓN

Invertebrados, especialmente insectos e arácnidos.

## COMPORTEMENTO

Móvese en grupos, entre a matogueira e o arboredo baixo. O seu niño é unha verdadeira obra mestra, feito con musgo, liques e pelos unidos con telas de araña. Nel traballan dende o interior ata pechar a estrutura e despois acolchan a parte interna con ata 2000 plumas; o niño presenta unha abertura na parte superior.

## REPRODUCCIÓN

Celo de marzo a maio, con unha (ocasionalmente dúas) posta ao ano, onde a femia pon 7-12 ovos brancos (ás veces con pintas vermellas), que incuba durante 13-14 días. Ás dúas semanas as crías xa poden voar.

## HÁBITAT

Zonas arboradas, especialmente carballeiras (aínda que tamén piñeirales e sobreirais)

## DISTRIBUCIÓN

Amplamente estendido dende a Península Ibérica ata Asia, faltando no extremo setentrional de Escandinavia, o norte de África, Cerdeña e Baleares.

## CURIOSIDADES

Os grupos familiares non se disgregan durante o inverno e móvense en pequenos bados reclamándose constantemente para manterse unidas.

No noso territorio aparece a forma "taiti".