

Sturnus unicolor Temminck, 1820

	estornio negro
	estornino negro
	araba zozo beltza
	estornell negre
	spotless starling
	estorninho-preto



FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Sturnidae	<i>Sturnus</i>



ESTADO DE CONSERVACIÓN



MEDIDAS CORPORAIS

Peso	85 g
Lonxitude	21-23 cm
Envergadura	38-42 cm

ALIMENTACIÓN

Invertebrados na época estival, o resto do ano froitos e sementes (gramíneas, leguminosas)

COMPORTEAMENTO

O niño é construído en tellados (onde poden provocar danos) ou en calquera greta ou recuncho dos edificios.

REPRODUCCIÓN

Celo de abril a xullo, con dúas postas anuais de 2-9 ovos de cor azul que a femia incuba durante 10-15 días. Os polos poden voar a partir dos 21-22 días.

HÁBITAT

Preferentemente entornos humanizados, pero tamén bosques, terreos agrícolas, etc.

DISTRIBUCIÓN

Limitado ao Mediterráneo occidental: península Ibérica, noroeste de África e illas de Córsega, Sardeña e Sicilia.

CURIOSIDADES

É unha especie xeralmente monógama. Descubríronse niños con postas esaxeradas que agora se atribúen a que as femias poñen ovos en niños que non son seus.

Despois da cría, os bandos de estornios deambulan polos cultivos e pradarías sendo beneficiosos por unha parte (xa que retiran unha grande cantidade de invertebrados perxudiciais) e moi dañinos cando atacan froiteiras ou viñedos. Son moi recoñecibles as formacións dos bandos ao atardecer antes de ocupar as durmideiras nos árbores.