Anagallis arvensis (< Lysimachia arvensis) L., 1753

	herba do formigo, muraxes, h. do garrotillo, h. da rabia
	murajes, anagálide, pimpinela escarlata, morrón, hierba de coral
	izugesle, pasmo-bedar
	anagall, herba sabonera, morró blau, morró vermell, pic de gallina
	scarlet pimpernel
	anagalis, bacuru de cores, murajes



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Liliopsida**	**Ericales**	**Primulaceae**	***Lysimachia***

ORIXE

Europa e Asia.

CARACTERÍSTICAS

Planta de ata 30 cm de altura. As follas son ovaladas, aguzadas, opostas, sen pecíolo e con glándulas negras por debaixo. As flores son de cor escarlata ou rosa asalmonado, e raramente azul. Teñen 5 pétalos máis ou menos redondeados e 5 sépalos moi bicudo. Encóntranse en pedúnculos estreitos que son máis longos cás follas e emerxen de cada axila foliar. O froito é unha cápsula esférica cun estilo persistente, e divídese pola metade.

HÁBITAT

Campos secos ou como mala herba anual en terreos cultivados.

DISTRIBUCIÓN

Rexións temperadas de Europa, Asia occidental e o norte de África. Introduciuse noutros continentes como é o caso de América.

CURIOSIDADES

As follas son útiles para saber a hora e predicir o tempo. Ábrense dende máis ou menos as 8 da mañá ata as 3 da tarde, e péchanse cando o aire é húmido e frío, ameazando choiva.