Cerastium glomeratum Thuill., 1799

- forquitela ennovelada
- oreja de ratón, pamplinillas
- sagu-biarria
- borrisol, cerasti aglomerat, pelovella glomerada
- sticky mouse-ear, sticky chickweed
- cerástio-enovelado, orelha-de-rato



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Caryophyllales**	**Caryophyllaceae**	***Cerastium***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Herba anual. Talos de 1-55 cm, erectos ou ascendentes, hirsutos e pilosos, con numerosos pelos glandulares. Follas de ata 40 × 17 mm, amplamente lanceoladas a case orbiculares, obtusas e pilosas. Flores agrupadas en cimas compactas e repetidamente dicótomas, xeralmente multiflorais. Pedicelos frutíferos máis curtos có cáliz ou, só ocasionalmente, os basais lixeiramente máis longos e erectos. Sépalos lanceolados, todos con bordos escariosos e pelos abundantes no dorso, na súa maioría glandulares. Pétalos xeralmente máis curtos ou lixeiramente máis longos có cáliz, ás veces ausentes. Sementes duns 0,5 mm, de cor marrón clara, ás veces escuras ou avermelladas, tuberculadas.

HÁBITAT

Vexetación herbácea, ruderal ou de beira de estradas, pasteiros efémeros, en todo tipo de substratos. Dende o nivel do mar ata os 2000 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Cosmopolita en sentido amplo. Común na Península Ibérica e nas Illas Baleares.

CURIOSIDADES

É unha herba moi variable, especialmente no que respecta ao tamaño dos pétalos e á forma das follas, mesmo dentro da mesma poboación.