Chelidonium majus L., 1753

- celidonia, ceruda, herba de andoriña/das espullas/leiteira
- celidonia mayor, hierba verruguera, golondrinera
- ainhara-belarra, zaran-belarra
- celidònia, herba d'orenetes/berruguera
- greater celandine
- quelidónia maior, erva das verrugas



Pl. 23. Chélidoine majeure. Chelidonium majus L.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Papaverales**	**Papaveraceae**	***Chelidonium***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Porte herbáceo perenne de crecemento rápido, ronda o metro de altura, e lonxevidade curta. Talo erguido, ramificado, ás veces con pelos escasos. Follas de 6-25 cm, alternas, de base algo peciolada nas inferiores, pinnatisectas e con lóbulos irregulares. As flores son de cor amarela brillante, con corola de 4 pétalos. Floración tipicamente en primavera-verán. O froito presenta forma de cápsula lineal, duns 2-5 cm, encargado da liberación de pequenas sementes.

HÁBITAT

Aparece en bordos de camiños, muros, lugares alterados, herbazais e pradeiras. Preferencia por solos húmidos, ben drenados e zonas parcialmente sombreadas.

DISTRIBUCIÓN

Amplamente distribuída en Europa e Asia occidental. Fóra do seu ámbito nativo foi introducida noutros lugares como América ou Nova Zelandia.

CURIOSIDADES

Contén alcaloides isoquinolinoicos como a chelidonia que teñen propiedades tóxicas e/ou irritantes.