Convulvulus sepium (< Calystegia s.) (L.) R.Br., 1810

- correola maior, herba roqueira, saltasebes, cabrinfollas
- corruhela/campanilla mayor
- ezkilluntza, ezkerte-zuri
- corretjola gran, campaneta de la Mare de Déu
- hedge bindweed
- corriola maior, campainha



DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Solanales**	**Convolvulaceae**	***Calystegia***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Porte herbáceo, perenne. Presenta rizomas ou talos subterráneos que lle permiten a expansión. Talo gabeador. Follas alternas, en forma de frecha ou corazón; limbo de ata 7 cm, base acorazonada ou saxitada. Flores solitarias, 1 ou 2, en pedúnculo axilar longo, normalmente brancas ou rosadas. Forman un cáliz con 5 sépalos libres enmascarado por 2 bractéolas grandes e foliáceas. A floración normalmente ocorre na primavera-verán. O froito ten forma de cápsula esférica ou subelipsoidal, con 2-4 sementes.

HÁBITAT

Aparece en ribeiras de ríos, cunetas, valados, muros ou marxes de zonas de cultivo. Prefire terreos húmidos, nitrificados e con boa exposición solar.

DISTRIBUCIÓN

Moi estendida en zonas do hemisferio norte con climas temperados.

CURIOSIDADES

Debido aos seus rizomas ten unha rápida expansión, por iso en ocasións se considera como “maleza” en fincas e xardíns.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor