
Holcus lanatus L., 1753

- herba triga, h. trigueira, h. brancal, h. trigá lanar, feo branco, holco
- heno blanco, holco, hierba macerguera, h. triga
- beluzea
- herba molla, herba triga, raspall, formental
- meadow soft grass
- erva lanar, erva molar, erva-mansa



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Liliopsida**	**Poales**	**Poaceae**	***Holcus***

ORIXE

Europa e o norte de África. Rexión mediterránea ata o Cáucaso.

CARACTERÍSTICAS

Perenne, cespitosa, recuberta de pilosidade suave, agás nos nós, con talos de ata 100 cm. Follas planas, con língula truncada, lacerada de 1-4 mm. Inflorescencia en panícula ovalada de 3-20 mm, a miúdo lobulada, abrancazada, rosácea ou purpúrea. Espículas de 3-5 mm, ciliadas na quilla, e con diferente pilosidade no resto, frecuentemente a superior presenta una aresta de ata 1 mm. Lema da flor inferior sen aresta. Lema da flor superior con aresta de 1-2 mm, curvada formando un gancho a 2 mm da punta, incluída na espícula ou apenas exerta.

HÁBITAT

Prados húmidos, pasteiros de sega, herbais húmidos, marxes de ríos e zonas removidas, e tamén pode atoparse en cunetas e lugares con problemas de drenaxe. Prefire solos húmidos e con certa acidez.

DISTRIBUCIÓN

Rexión mediterránea e rexión holártica. América do Norte e do Sur e Asia.

CURIOSIDADES

As espiguiñas da planta teñen dúas flores, e a lema da flor superior presenta unha aresta curvada ou ganchuda que axuda á súa identificación.