


Juncus bufonius L., 1753

	xunco, x. dos sapos, pelo de cocho
	junco de sapo, j. de rana, hierba de sapo, resbalabueyes
	jungu, ihi, ziri
	jonc de galàpet
	toad rush
	junco-dos-sapos, junco-das-rãs



ESTADO DE CONSERVACIÓN



EX: en perigo de extinción; **ES:** extinta en estado silvestre; **CR:** en perigo crítico; **EP:** en perigo; **VU:** vulnerable; **CA:** case ameazada; **PM:** preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Juncaceae	<i>Juncus</i>

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Herba anual, de 1-45 cm de altura, con talos erectos ou ascendentes, solitarios ou fasciculados. Follas dispostas na base e ao longo dos talos, ás veces as basais sen lámina. Vaíña non auriculada, xeralmente verdosa ou amarelada, ás veces avermellada. Inflorescencia de 0,5-23 cm de lonxitude. Flores xeralmente solitarias, ás veces emparelladas nos extremos das pólas, raramente algunhas agrupadas en fascículos de 3 flores, subsésiles ou con pedicelos de ata 1,3 mm de longo, con 2 bractéolas involucrais de 2-2,5 mm de longo, ovado-acuminadas, escariosas. Sementes de 0,3-0,45 mm, oblicuamente ovoides ou elipsoidais, lisas ou finamente estriadas, amareladas ou ferruxinosas, ás veces con veas avermelladas irregulares cando non están completamente maduras, sen apéndices. Florece de marzo a setembro.

HÁBITAT

Pasteiros terofíticos, en solos temporalmente inundados por auga doce. Dende o nivel do mar ata os 2250 m.

DISTRIBUCIÓN

Cosmopolita. Moi común en toda a Península Ibérica e as Illas Baleares.

CURIOSIDADES

Igual ca outras plantas de xunco, axuda a controlar a erosión do solo grazas ó seu denso sistema de raíces que estabiliza o terreo.