Merendera pyrenaica (< Colchicum montanum) (Pourr.) P.Fourn., 1935

- tollemerendas, quitamerendas, cólquico, merendeira, cebola de cabalo
- quitameriendas
- udazken-lorea
-
- false meadow saffron
- açafrão bravo



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Liliopsida**	**Liliales**	**Colchicaceae**	***Colchicum***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Porte herbáceo. A súa raíz presenta tubérculos globosos. O talo aéreo é practicamente inexistente, as flores parecen saír directamente do chan. As follas, duns 5-15 cm, son lineais, estreitas e de cor verde brillante. Xorden na seguinte primavera á floración. As flores son a parte máis destacada, aparecen a finais do verán ou principios do outono. Son solitarias, de cor rosa lilácea, ocasionalmente pálidas. Presentan pétalos lanceolados, duns 2-4 cm con estames amarelos no centro. O froito desenvólvese en forma de cápsula soterrada durante o inverno e emerxe na primavera para liberar as sementes.

HÁBITAT

Lugares abertos, secos e solleiros. Aparece en pastos a unha certa altitude, ladeiras pedregosas e claros de matogueiras. Prefire solos ben drenados e frecuentemente calcarios. Está ligada principalmente a zonas montañosas, húmidas e con veráns pouco secos.

DISTRIBUCIÓN

Nativa do norte da Península Ibérica. Aparece sobre todo nos Pireneos, na Cordilleira Cantábrica e no Sistema Ibérico norte.

CURIOSIDADES

A floración outonal faina destacar, xa que nesta época poucas especies teñen flor. Como outros colchiáceos, contén alcaloides do tipo colchicina, o que a fai tóxica se se inxire.