
Rumex crispus L., 1753

- carvea, carvén, carvés, cardea, labaza, carbea, carbesa, herba alabarza
- lampazo, romaza, lengua de buey, vinagrera, paciencia
- uztaoa
- paradella crespa, vinagrella, llengua de bou
- curly dock, narrowleaf dock, sour doc
- língua de vaca, labaça-crespa, regalo-da-horta



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Caryophyllales**	**Polygonaceae**	***Rumex***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Planta perenne, de ata 2,5 m de altura. Talos erectos con sucos estriados. Follas basais de 60-260 x 10-70 mm, oblongo-lanceoladas, cuneadas ou menos frecuentemente truncadas ou redondeadas na base; agudas, cunha marxe xeralmente ondulada. Lámina máis longa ou igual có pecíolo. Inflorescencia máis densa, con ramas primarias simples ou ramificadas e verticilos medios e superiores (sub)contiguos. Pedicelos de ata 10 mm de longo, filiformes, dilatados no ápice, cravados. Partes externas do perianto frutífero de 1,5-2,5 mm. Valvas ovado-triangulares ou cordadas, enteiras ou denticuladas, con dentes de ata 0,5 mm. Tubérculo piriforme, xeralmente desenvolvido só nunha valva, moito máis pequeno ou ausente nas outras. Aquenios de cor marrón avermellada escura.

HÁBITAT

Pastos húmidos nitrificados, gabias, ribeiras, beiras de cursos de auga e ambientes frescos xeralmente perturbados. Dende o nivel do mar ata 2000 m.

DISTRIBUCIÓN

Subcosmopolita. Distribución xeneralizada que abrangue Europa, a Macaronesia, Asia e o norte de África.

CURIOSIDADES

Utilízase de varias maneiras para a alimentación, a medicina, como colorante e como activador de bacterias no compost. As follas, os talos e as sementes pódense comer, e estas últimas empregáronse como substituto do café.