
Sherardia arvensis L., 1753

- rubia dos campos, granza dos campos
- rábula borde, revoli, raspilla
- borraja txikia, kizkizari
- rèvola borda
- field madder
- granza, granza-dos-campos



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Tracheophyta	**Magnoliopsida**	**Gentianales**	**Rubiaceae**	***Sherardia***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Herba anual. Talos de ata 50 cm, simples ou ramificados dende a base, erectos ou ascendentes, glabros ou máis ou menos setoso-híspidos na rexión de floración. Follas de 4-17 × 2-5 mm. As basais en verticilos de 4, obovadas, mucronadas, a miúdo secas ou ausentes na floración. As medias e superiores en verticilos de 5-6, oblongo-lanceoladas, linear-lanceoladas ou obovadas, agudas, mucronadas, cunha nervadura central visible no envés. Inflorescencias con brácteas semellantes ás follas pero xeralmente con ráfidos máis visibles; os do involucro xeralmente máis grandes cás flores. O froito consta de dous mericarpos, de 2 a 7 mm de longo, cunha soa semente no seu interior. Florece de abril a setembro.

HÁBITAT

Pastos terófitos en beiras de estradas, terreos baldíos, campos, muros, etc. Edáfica indiferente. Dende o nivel do mar ata 1700 m.

DISTRIBUCIÓN

Europa, oeste de Asia, norte de África e a Macaronesia (agás Cabo Verde). Case toda a Península Ibérica e as Illas Baleares. Introducida globalmente noutras rexións e agora case subcosmopolita.

CURIOSIDADES

A planta medra polo chan de xeito rastreiro ou prostrado, aínda que as puntas dos seus talos poden medrar cara a arriba. Isto pode facela parecer máis pequena do que realmente é.