Acer saccharinum (>< A. saccharum) L., 1753

- pradairo prateado
- arce plateado
- astigar zilarra
- auró argentat
- silver maple
- ácer prateado



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Sapindales**	**Sapindaceae**	***Acer***

ORIXE

América.

CARACTERÍSTICAS

Planta de porte arbóreo de crecemento rápido. Tronco erecto, codia gris clara, lisa en exemplares novos e fendida coa idade. Pode acadar os 25 m de altura. Copa ampla, irregular e aberta, con pólas longas e arqueadas. Follas opostas, palmeadas, con 5 lóbulos profundos e bordos dentados. Cara superior verde e envés prateado. Pecíolo longo. No outono vólvense de cor amarela pálida a dourada. Flores pequenas, verdosas e avermelladas, sen pétalos evidentes. Florece na primavera. Froito disámaro, con ás longas e abertas. Frutificación na primavera-verán.

HÁBITAT

Habita en ribeiras de ríos, chairas de inundación, zonas húmidas e solos aluviais. Prefire solos profundos, frescos e fértiles. Tolera ben enchentes temporais.

DISTRIBUCIÓN

Orixinaria do leste e centro de América do Norte. Introducida e cultivada en Europa, onde se emprega fundamentalmente como especie ornamental.

CURIOSIDADES

É moi empregada en xardinaría urbana, dá sombra rápido debido ao seu rápido crecemento e é bastante resistente á contaminación urbana.