
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch, 1887

	videira/vide/parra virxe, videira de Virxinia, vide trepadora
	enredadera de Virginia, parra virgen
	vynia verge, heura de Virginia
	Virginia creeper
	vinha-virgem, trepadeira de Virginia, videira virgem



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Tracheophyta	**Magnoliopsida**	**Vitales**	**Vitaceae**	***Parthenocissus***

ORIXE

América do Norte.

CARACTERÍSTICAS

Planta gabeadora, leñosa, ascendente. Talos con gromos novos pilosos. Codia marrón-agrisada, irregularmente estriada, con lenticelas e restos de gabiáns. Follas con láminas de 7-25 × 11-19 cm, compostas, palmatipartitas; xeralmente con 4-6 folíolos de ovoides a elípticos, cuneados, cun pecíolo de 0,5-6 mm de longo e un ápice serrado. Inflorescencias en panículas de ata 5 cm de ancho, xeralmente opostas ás follas, bifurcadas con 2 pólas diverxentes, con pedúnculos de 2-6 cm de longo. Flores con pedicelos de aproximadamente 2 mm de longo. Cáliz con sépalos escamosos de 0,5-1 mm. Pétalos de 2-3 mm, ovados, agudos, emarxinados, cunha marxe branca no ápice e abertura apical. O froito é una baga de 5-8 mm, con pedicelos lixeiramente engrosados, de azulado a negro. Sementes de 2-3 mm.

HÁBITAT

Bosques de aciñeiras degradados, afloramentos rochosos costeiros, ribeiras, amieirais, campos abandonados e muros. Principalmente en solos básicos. Dende 3 ata 900 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Leste e centro dos Estados Unidos e sueste do Canadá, estendéndose cara ao sur ata o leste de México e América Central. Foi introducida en todo o mundo, agás na Antártida.

CURIOSIDADES

Os froitos son tóxicos debido ao seu contido en ácido oxálico, aínda que o seu consumo é improbable debido ao seu sabor desagradable.