Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst., 1776

	liño de Nova Zelandia, formio
	lino de Nueva Zelanda, fornia
	formi, lli de Nova Zelanda
	New Zealand flax
	linho-da-Nova-Zelândia



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Tracheophyta	**Liliopsida**	**Asparagales**	**Asphodelaceae**	***Phormium***

ORIXE

Oceanía.

CARACTERÍSTICAS

Planta perenne, sempre verde. Medra en forma de mato; ríxida e máis ou menos erecta. Talo pesado, de cores brillantes. Pedúnculo de 2-3 cm de diámetro, erecto, escuro, cilíndrico e glabro. Follas longas en forma de tiras de ata 2 m de longo. Puntas dos tépalos internos só lixeiramente curvadas. Ovario erecto; carpelos rectos. Cápsula duns 10 cm de lonxitude, a miúdo menor, erecta, trígonosa, bruscamente contraída ata a punta, non retorcida, permanecendo firme e escura coa idade. Flores predominantemente de cores vermellas apagadas. Sementes elípticas, en forma de placa, máis ou menos retorcidas. Florece entre novembro e decembro; frutificación entre xaneiro e marzo.

HÁBITAT

Bosques e zonas arboradas, matogueiras e pasteiros. Medra principalmente en climas temperados. Entre os 2000 e os 2850 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Nativa da Illa de Norfolk, Nova Zelandia. Atópase distribuída nos Estados Unidos, na India, en África, en América Central, no Taiwán, no Xapón, e nalgunas partes de Europa.

CURIOSIDADES

Emprégase en medicina. Tamén ten usos ambientais e alimentarios. As follas conteñen cucurbitacinas, que son tóxicas para algúns seres vivos.