
Salix alba subsp. vitellina (>< S. viminalis) (L.) Stokes, 1812

- salgueiro dourado, vimeiro dourado, v. amarelo, vimbiero a., vimiero a.
- sauce color yema, vimetera amarilla, mimbrera a., sauce vitelino
- sahats zuri
- vimera, vimetera groga, salze
- osier willow
- salgueiro-dourado, vimeiro-amarelo/dourado



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Tracheophyta	**Magnoliopsida**	**Malphigiales**	**Salicaceae**	***Salix***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Árbore caducifolia de porte erecto e estendido, aínda que algo colgante, de 10-15 m de altura e crecemento rápido. Forma xeralmente redondeada, cun ou máis troncos coroados por unha copa moi ampla. Codia marrón amarelada. Pólas longas, flexibles e lisas da mesma cor e pubescentes cando son novas. Follas caducas, estreitas e lanceoladas, de ata 10 cm de longo. Ambos os lados da lámina foliar son sedosos, a superficie superior é brillante e de cor verde intensa, e a superficie inferior é branca prateada. Flores amarelas agrupadas en acios. Florece en abril-maio.

HÁBITAT

Na maioría dos tipos de solo, aínda que prefire os solos francoareosos. Pódese plantar en solos húmidos. Tolera inundacións breves e prolongadas e a pavimentación. Plántase en avenidas e rúas anchas. Resistente ás xeadas.

DISTRIBUCIÓN

Rexións húmidas do hemisferio norte, particularmente Europa, Asia temperada e norte de África

CURIOSIDADES

É moi útil en permacultura debido ao seu rápido crecemento e á súa facilidade de propagación. Úsase para a estabilización das ribeiras e o control da erosión, como cortaventos e para a produción de biomasa.